

Vue d'ensemble Modèles Spéciaux Ortho[®]

Ortho Rehab Total

45610



Ortho Rehab 3

45580



Ortho Open

45600



Ortho Sandale

45590



Indikationen

Traitement conservateur ou post-opératoire après une rupture du tendon d'Achille

Traitement chirurgical d'une tendinopathie du tendon d'Achille, exostoses de Haglund

Douleurs chroniques du tendon d'Achille

Utilisation post-opératoire après une suture/reconstruction des ligaments, fracture malléolaire, ostéotomie de correction, arthrodèse, arthroplastie

Thérapie conservative lors de blessures des parties molles et des blessures aux os du milieu et de l'arrière du pied (p. ex. graves distorsions de l'articulation supérieure)

Thérapie conservative en cas d'instabilité chronique de l'articulation supérieure ou lors de maladies inflammatoires et dégénératives (p. ex. arthrose)

Utilisation dans le cas de diverses infirmités de naissance

Utilisation dans le cas de diverses infirmités de naissance

Utilisation dans le cas de paralysie spastique ou flasque

Thérapie conservative lors de blessures des parties molles et des blessures aux os du milieu et de l'arrière du pied (p. ex. graves distorsions de l'articulation supérieure)

Thérapie conservative en cas d'instabilité chronique de l'articulation supérieure ou lors de maladies inflammatoires et dégénératives (p. ex. arthrose)

Utilisation dans le cas de diverses infirmités de naissance

Utilisation dans le cas de paralysie spastique ou flasque

Thérapie conservative lors de blessures des parties molles et des blessures aux os du milieu et de l'arrière du pied (p. ex. graves distorsions de l'articulation supérieure)

Thérapie conservative en cas d'instabilité chronique de l'articulation supérieure ou lors de maladies inflammatoires et dégénératives (p. ex. arthrose)

